

Espèce	Dénomination variété	Année inscription	Résistance au	
			Nématode betterave <i>Heterodera schachtii</i>	Autres résistances
Moutarde blanche	Aba	1999	résistant	
Moutarde blanche	Amog	1993	résistant	
Moutarde blanche	Chacha	2005	résistant	
Moutarde blanche	Meringue	2000	résistant	
Moutarde blanche	Polka	1999	résistant	
Moutarde blanche	Salsa	2000	résistant	
Moutarde blanche	Solea	2005	résistant	
Moutarde blanche	Swing	1999	résistant	

Espèce	Dénomination variété	Année inscription	Résistance au	
			Nématode betterave <i>Heterodera schachtii</i>	Autres résistances
Radis Fourrager	Brutus	1998	résistant	
Radis Fourrager	Cassius	2001	résistant	
Radis Fourrager	Dux	1999	résistant	
Radis Fourrager	Sirius	2000	résistant	
Radis Fourrager	Sixtus	2002	résistant	

Espèce	Dénomination variété	Année inscription	Classe de résistance (1) Nématode betterave <i>Heterodera schachtii</i>	Développement masse début de croissance	Tendance à la floraison (2)	Tendance à la verse (2)	Autres résistances
Moutarde blanche	Abraham	2003	2	5	4	2	
Moutarde blanche	Absolvent	2003	2	7	4	3	
Moutarde blanche	Accent	2002	1	6	4	3	
Moutarde blanche	Achilles	1998	1	6	4	2	
Moutarde blanche	Action	2014	2	8	3	3	
Moutarde blanche	Admiral	1998	2	5	3	1	
Moutarde blanche	Albatros	2008	-	7	5	4	
Moutarde blanche	Architect	2003	2	6	4	2	
Moutarde blanche	Arda	1977	-	6	6	4	
Moutarde blanche	Ascot	1992	-	6	5	4	
Moutarde blanche	Asta	1989	-	6	6	5	
Moutarde blanche	Athlet	2008	2	6	3	2	
Moutarde blanche	Attack	2006	2	6	5	5	
Moutarde blanche	Brilliant	2011	2	6	4	2	
Moutarde blanche	Brisant	2010	2	6	5	1	
Moutarde blanche	Chacha	2006	2	6	5	2	
Moutarde blanche	Collina	2012	2	7	3	3	
Moutarde blanche	Comique	2006	2	6	6	4	
Moutarde blanche	Concerta	2008	2	6	5	4	
Moutarde blanche	Cover	2002	-	6	4	2	
Moutarde blanche	Dr. Francks Hohenheimer Gelb	1955	-	7	5	3	
Moutarde blanche	Emergo	1985	2	5	5	4	
Moutarde blanche	Esprit	2004	2	5	5	2	
Moutarde blanche	Forum	2003	2	7	4	3	
Moutarde blanche	Futura	2011	2	7	4	2	
Moutarde blanche	Gaudi	2006	2	6	3	4	
Moutarde blanche	Gisilba	1957	-	6	7	4	
Moutarde blanche	Greco	2005	2	6	4	3	
Moutarde blanche	IndianSummer	2012	2	7	3	3	
Moutarde blanche	Iris	2012	2	7	3	2	
Moutarde blanche	King	2005	-	6	4	3	
Moutarde blanche	Litember	1987	-	7	5	3	
Moutarde blanche	Lopex	2005	2	5	3	2	

Espèce	Dénomination variété	Année inscription	Classe de résistance (1) Nématode betterave <i>Heterodera schachtii</i>	Développement masse début de croissance	Tendance à la floraison (2)	Tendance à la verse (2)	Autres résistances
Moutarde blanche	Lotus	2004	2	5	3	3	
Moutarde blanche	Lucida	2013	2	5	2	1	
Moutarde blanche	Luna	2002	2	5	4	4	
Moutarde blanche	Martigena	1990		5	6	5	
Moutarde blanche	Master	2012	2	8	4	3	
Moutarde blanche	Maxi	1985	2	6	5	3	
Moutarde blanche	Medicus	2001	2	6	4	3	
Moutarde blanche	Octopus	2015	-	3	3	2	
Moutarde blanche	Odysseus	2011	2	6	4	3	
Moutarde blanche	Oscar	1990	2	5	5	2	
Moutarde blanche	Passion	2009	2	6	4	2	
Moutarde blanche	Pionier	2012	-	6	5	1	
Moutarde blanche	Pirat	2012	-	7	3	2	
Moutarde blanche	PolePosition	2011	2	7	3	2	
Moutarde blanche	Profi	2006	2	6	3	3	
Moutarde blanche	Rizo	1983	-	4	6	4	
Moutarde blanche	Rumba	2006	2	6	3	2	
Moutarde blanche	Saloon	2002	2	6	4	2	
Moutarde blanche	Salvo	1989	2	5	5	3	
Moutarde blanche	Samba	1996	2	5	4	4	
Moutarde blanche	Santa Fe	1992	2	6	5	2	
Moutarde blanche	Sarah	2011	-	6	5	2	
Moutarde blanche	Seco	1999	-	5	3	2	
Moutarde blanche	Semper	1999	-	6	4	2	
Moutarde blanche	Serval	1985	2	5	5	4	
Moutarde blanche	Setoria	2002		6	4	3	
Moutarde blanche	Severka	2005	-	6	6	3	
Moutarde blanche	Sibeliuss	2008	2	5	3	2	
Moutarde blanche	Signal	1980	-	7	5	4	
Moutarde blanche	Signo	2003	-	6	3	4	
Moutarde blanche	Sigri	2005	2	6	3	3	
Moutarde blanche	Silenda	1989	-	5	6	5	
Moutarde blanche	Silvester	1994	2	5	4	3	

Espèce	Dénomination variété	Année inscription	Classe de résistance (1) Nématode betterave <i>Heterodera schachtii</i>	Développement masse début de croissance	Tendance à la floraison (2)	Tendance à la verse (2)	Autres résistances
Moutarde blanche	Simona	2005	2	5	3	3	
Moutarde blanche	Sirola	1995		5	4	2	
Moutarde blanche	Sirtaki	2004	2	6	3	4	
Moutarde blanche	Sirte	2004	2	7	4	3	
Moutarde blanche	Symbol	2011	2	6	4	2	
Moutarde blanche	Topas	2015	2	7	3	3	
Moutarde blanche	Torpedo	1994	2	6	4	2	
Moutarde blanche	Ultra	1992	2	6	5	4	
Moutarde blanche	Venice	2013	2	5	2	1	
Moutarde blanche	Veto	2009	2	6	4	2	
Moutarde blanche	Vitaro	2012	2	7	4	2	
Moutarde blanche	Zlata	1989	-	6	5	3	

(1) : les classes 1 et 2 sont considérées comme "résistant au nématode à kyste de la betterave"

(2) : plus le chiffre est élevé, plus la tendance est atteinte

Espèce	Dénomination variété	Année inscription	Classe de résistance (1) Nématode betterave <i>Heterodera schachtii</i>	Développement masse début de croissance	Tendance à la floraison (2)	Tendance à la verse (2)	Autres résistances
Radis fourrager	Adagio	1990	2	5	3	2	
Radis fourrager	Adam	2007	2	6	4	3	
Radis fourrager	Adios	1997	1	5	3	2	
Radis fourrager	Akiro	2005	-	7	6	4	
Radis fourrager	Apoll	1980	-	6	6	4	
Radis fourrager	Arrow	2006	2	6	3	2	
Radis fourrager	Baracuda	2012	2	6	3	2	
Radis fourrager	Bento	2003	-	6	4	2	
Radis fourrager	BlackJack	2011	1	2	2	2	+ Meloidogyne chitwoodii
Radis fourrager	Caprice	2011	2	5	3	2	
Radis fourrager	Cassius	2002	2	6	3	3	
Radis fourrager	Colonel	1996	1	5	5	3	
Radis fourrager	Comet	2004	1	5	4	3	
Radis fourrager	Compass	2009	2	6	3	1	
Radis fourrager	Concorde	2011	2	7	5	3	
Radis fourrager	Consul	2001	1	4	3	2	
Radis fourrager	Contra	2007	1	5	3	2	+ Meloidogyne chitwoodii
Radis fourrager	Corporal	2004	1	5	4	2	
Radis fourrager	Cosmos	2009	1	5	3	2	
Radis fourrager	Dacapo	1995	2	6	4	2	
Radis fourrager	Defender	2004	2	5	3	2	
Radis fourrager	Diabolo	1994	2	6	4	2	
Radis fourrager	DonQuichote	2013	2	6	4	2	
Radis fourrager	Doublet	2007	1	4	3	1	
Radis fourrager	Dracula	2010	2	4	3	2	
Radis fourrager	Edwin	2011	2	6	3	2	
Radis fourrager	Eexta	2004	2	7	7	4	
Radis fourrager	Evergreen	2008	2	4	3	2	
Radis fourrager	Farmer	2011	2	4	3	3	+ Meloidogyne chitwoodii
Radis fourrager	Final	1997	1	5	3	2	
Radis fourrager	Gallius	2005	-	6	5	3	
Radis fourrager	Ikarus	1988	-	6	6	4	
Radis fourrager	Illusion	2009	2	7	4	1	

Espèce	Dénomination variété	Année inscription	Classe de résistance (1) Nématode betterave <i>Heterodera schachtii</i>	Développement masse début de croissance	Tendance à la floraison (2)	Tendance à la verse (2)	Autres résistances
Radis fourrager	Image	2007	1	4	3	2	
Radis fourrager	Intermezzo	2010	2	6	3	2	
Radis fourrager	Karakter	2003	2	7	6	4	
Radis fourrager	Kontur	2009	2	5	3	1	
Radis fourrager	Lunetta	2003	-	6	5	3	
Radis fourrager	Maximus	2007	1	5	3	2	
Radis fourrager	Melody	2006	-	6	7	5	
Radis fourrager	Melotop	2012	2	7	3	2	
Radis fourrager	Mercator	2013	2	7	4	3	
Radis fourrager	Merkur	2013	2	7	4	2	
Radis fourrager	Nero	2006	2	4	3	2	
Radis fourrager	Octopus	2009	2	6	5	2	
Radis fourrager	Pegletta	1980	2	5	7	4	
Radis fourrager	Picobello	2000	1	4	4	2	
Radis fourrager	Pina	2011	2	7	3	2	
Radis fourrager	Radetzky	2010	2	4	3	2	+ Meloidogyne chitwoodii
Radis fourrager	Radical	1992	2	5	3	1	
Radis fourrager	Ramses	2002	1	5	3	2	
Radis fourrager	Reaktor	2009	2	7	6	2	
Radis fourrager	Reflex	2002	1	4	3	2	
Radis fourrager	Reform	1999	-	5	4	2	
Radis fourrager	Rego	1997	-	6	5	4	
Radis fourrager	Regresso	1995	2	6	5	3	
Radis fourrager	Remonta	1992	2	6	4	3	
Radis fourrager	Reset	2007	1	4	3	1	
Radis fourrager	Resolution	2011	2	7	4	2	
Radis fourrager	Respect	2008	1	4	3	2	
Radis fourrager	Reviso	2003	2	6	4	3	
Radis fourrager	Revolver	2007	1	6	4	2	
Radis fourrager	Rimbo	1991	2	5	4	3	
Radis fourrager	Rufus	1989	-	6	4	2	
Radis fourrager	Rutina	1989	-	6	6	4	
Radis fourrager	Siletina	1967	-	7	6	4	

Espèce	Dénomination variété	Année inscription	Classe de résistance (1) Nématode betterave <i>Heterodera schachtii</i>	Développement masse début de croissance	Tendance à la floraison (2)	Tendance à la verse (2)	Autres résistances
Radis fourrager	Siletta Nova	1980	-	6	4	2	
Radis fourrager	Sixtus	2005	2	5	3	2	
Radis fourrager	Splendid	2009	2	6	8	5	
Radis fourrager	Tajuna	2012	2	6	5	3	+ Meloidogyne chitwoodii
Radis fourrager	Terranova	2006	2	4	3	1	+ Meloidogyne chitwoodii
Radis fourrager	Toro	1982	-	6	3	1	
Radis fourrager	Trick	1990	-	6	5	2	
Radis fourrager	Valencia	2011	2	6	3	2	+ Meloidogyne chitwoodii
Radis fourrager	Xcellent	2009	2	6	3	2	

(1) : les classes 1 et 2 sont considérées comme "résistant au nématode à kyste de la betterave"

(2) : plus le chiffre est élevé, plus la tendance est atteinte

Espèce	Dénomination variété	Année inscription	Résistance au Nématode	
			betterave <i>Heterodera schachtii</i>	Autres résistances
Moutarde blanche	Achat	2008	résistant	
Moutarde blanche	Achilles	2003	résistant	
Moutarde blanche	Cabri	1997	-	
Moutarde blanche	Cador	1998	-	
Moutarde blanche	Candela	2002	résistant	
Moutarde blanche	Carabosse	2007	résistant	
Moutarde blanche	Caralba	1995	résistant	
Moutarde blanche	Cargold	1994	résistant	
Moutarde blanche	Cariane	1999	-	
Moutarde blanche	Caribella	2003	résistant	
Moutarde blanche	Carla	1984	-	
Moutarde blanche	Carline	2008	résistant	
Moutarde blanche	Carnaval	1992	résistant	
Moutarde blanche	Dignis	2002	résistant	
Moutarde blanche	Emergo	1984	résistant	
Moutarde blanche	Ludique	2000	-	
Moutarde blanche	Metex	1991	résistant	
Moutarde blanche	Ogtan	1995	résistant	
Moutarde blanche	Sito	1996	résistant	
Moutarde blanche	Sirene	2012	résistant	

Espèce	Dénomination variété	Année inscription	Résistance au Nématode	
			betterave <i>Heterodera schachtii</i>	Autres résistances
Radis fourrager	Adios	2003	résistant	
Radis fourrager	Cannavaro	2014	résistant	
Radis fourrager	Cardinal	1998	-	
Radis fourrager	Carlos	1994	résistant	
Radis fourrager	Carwoodi	2005	-	+ Meloidogyne chitwoodii
Radis fourrager	Doublet	2007	résistant	+ Meloidogyne chitwoodii
Radis fourrager	Iris	1983	-	
Radis fourrager	Melotop	2008	résistant	
Radis fourrager	Mercator	2013	résistant	
Radis fourrager	Reflex	2003	résistant	

Espèce	Dénomination variété	Classe de résistance (1)		Date de floraison (3)	Résistance à la verse (3)
		Nématode betterave <i>Heterodera schachtii</i>	Démarrage foliaire (3)		
Moutarde blanche	Accent	2	8	8	6,5
Moutarde blanche	Architect	2	8	8,5	7
Moutarde blanche	Bonapart	2	8	8,5	8
Moutarde blanche	Brisant	2	7,5	8,5	8
Moutarde blanche	Carline	2	7,5	8,5	7,5
Moutarde blanche	Center	2	7,5	8,5	6,5
Moutarde blanche	Cratos	2	8	8	8
Moutarde blanche	Esprit	2	8	8,5	7,5
Moutarde blanche	Forum	2	8	8,5	7
Moutarde blanche	Indian Summer	2	8,5	8,5	6
Moutarde blanche	Passion	2	8,5	8,5	6
Moutarde blanche	Saloon	2	8	8	6,5
Moutarde blanche	Sirtaki	2	8	8,5	5
Moutarde blanche	Smash	2	8	8	6,5
Moutarde blanche	Vitaro	2	8,5	8,5	8
Moutarde blanche	Venice	2	8	9	8

(1) : les classes 1 et 2 sont considérées comme "résistant au nématode à kyste de la betterave"

(3) Un chiffre élevé signifie un recouvrement du sol rapide, une floraison tardive et une résistance élevée à la verse

Espèce	Dénomination variété	Classe de résistance (1)		Date de floraison (3)	Résistance à la verse (3)	Autres résistances
		Nématode betterave <i>Heterodera schachtii</i>	Démarrage foliaire (3)			
Radis fourrager	Adam	2	8	7,5	-	
Radis fourrager	Adios	1	7	9	9	
Radis fourrager	Arrow	2	7,5	8,5	-	
Radis fourrager	Baracuda	2	7,5	9	-	
Radis fourrager	Brutus	2	8	8	7,5	
Radis fourrager	Carwoodi	-	7	9	-	+ Meloidogyne chitwoodii
Radis fourrager	Colonel	1	7,5	7.5	6	
Radis fourrager	Comet	1	7	8,5	8	
Radis fourrager	Contra	1	8	9	-	
Radis fourrager	Corporal	1	7,5	8.5	8	
Radis fourrager	Cosmos	1	8	8.5	-	
Radis fourrager	Defender	2	8	8	-	
Radis fourrager	Doublet	1	7.5	8,5	-	+ Meloidogyne chitwoodii
Radis fourrager	Dracula	2	6.5	9	-	+ Meloidogyne chitwoodii
Radis fourrager	Edwin	2	7.5	9	-	
Radis fourrager	Evergreen	2	7	8.5	-	
Radis fourrager	Final	1	7	9	9	
Radis fourrager	Guillotine	2	8	7.5	-	
Radis fourrager	Image	1	7	8,5	-	
Radis fourrager	Maximus	1	8	8.5	-	
Radis fourrager	Melotop	2	8	8.5	-	+ Meloidogyne chitwoodii
Radis fourrager	Merkur	2	8.5	8.5		+ Meloidogyne chitwoodii
Radis fourrager	Nemaflex	2	7	9		
Radis fourrager	Radetzky	2	7	9	-	+ Meloidogyne chitwoodii
Radis fourrager	Radical	2	8	9	8,5	
Radis fourrager	Reflex	1	7	8.5	-	
Radis fourrager	Reset	1	7	9	-	
Radis fourrager	Resolution	2	7.5	7.5	-	
Radis fourrager	Respect	1	7	8	-	
Radis fourrager	Saturn	2	7.5	8.5	7.5	
Radis fourrager	Serum	2	8	8.5	7.5	
Radis fourrager	Tajuna	2	7.5	7.5	-	+ Meloidogyne chitwoodii
Radis fourrager	Valencia	2	7.5	8.5	-	+ Meloidogyne chitwoodii
Radis fourrager	Xcellent	2	7.5	8,5	-	

(1) : les classes 1 et 2 sont considérées comme "résistant au nématode à kyste de la betterave"

(3) Un chiffre élevé signifie un recouvrement du sol rapide, une floraison tardive et une résistance élevée à la verse